



acebrofilina

Medley.

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

Xarope: embalagens contendo frascos de 120 ml, acompanhados de dosadores.
USO PEDIÁTRICO OU ADULTO

COMPOSIÇÕES

Cada 5 ml do **xarope pediátrico** contém:
acebrofilina 25 mg
veículo q.s.p. 5 ml
(aroma de cereja, aroma de framboesa, ácido cítrico, benzoato de sódio, ciclamato de sódio, citrato de sódio diidratado, glicerol, hietelose, sorbitol, água deionizada).

Cada 5 ml do **xarope adulto** contém:
acebrofilina 50 mg
veículo q.s.p. 5 ml
(aroma de cereja, aroma de framboesa, ácido cítrico, álcool etílico, benzoato de sódio, ciclamato de sódio, citrato de sódio diidratado, glicerol, hietelose, mentol, sorbitol, água deionizada).

Este produto NÃO contém açúcar e nem corantes.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- **Ação esperada do medicamento:** a acebrofilina tem ação broncodilatadora, mucorre- guladora e expectorante.
- **Cuidados de armazenamento:** conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).
- **Prazo de validade:** 24 meses a partir da data de fabricação, que pode ser verificada na embalagem externa do produto. Não utilize o medicamento se o prazo de validade estiver vencido. Pode ser prejudicial a sua saúde.
- **Gravidez e lactação:** informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamen- to ou após o seu término. Informe ao seu médico se está amamentando.
- **Cuidados de administração:** siga a orienta- ção do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
- **Interrupção do tratamento:** não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
- **Reações adversas:** informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como náuseas ou tontura.

"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS."

• **Ingestão concomitante com outras subs- tâncias:** a administração concomitante com outros medicamentos só deve ser feita sob orientação médica.

• **Contra-indicações e Precauções:** este pro- duto é contra-indicado em pacientes com reco- nhecida hipersensibilidade à droga ou a outros derivados da xantina e em casos de hipertensão. O produto deve ser utilizado com cautela em pacientes que apresentem cardiopatias, hiperten- são, hipoxemia severa e úlcera péptica.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

"NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE."

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Descrição

A acebrofilina é uma molécula que possui ação broncodilatadora, mucorre- guladora e expecto- rante.

Modo de Ação

A acebrofilina possui vários mecanismos pelo qual exerce seu efeito terapêutico. Atua fragmentando e desagregando a organização filamentosa do muco, de forma a diminuir sua viscosidade e adesi- vidade e tornando as secreções do aparelho respiratório mais fluidas.

A acebrofilina estimula a síntese e secreção do surfactante alveolar, favorecendo a expulsão das secreções bronquiais melhorando, portanto, a capacidade de ventilação. Por sua ação broncodi- latadora, inibe o broncoespasmo, a dispnéia e os sibilos, melhorando a função respiratória com o aumento do fluxo respiratório.

Farmacocinética

Este medicamento administrado por via oral em indivíduos adultos e saudáveis, proporciona altas concentrações do princípio ativo no plasma, per- sistindo por algumas horas. A meia-vida plasmáti- ca varia de 3 a 5 horas após a administração oral.

BU0180



INDICAÇÕES

Este medicamento é indicado como broncodilatador, mucolítico e expectorante.

Para o tratamento sintomático das patologias agudas e crônicas do aparelho respiratório caracterizadas por fenômenos de hipersecreção, traqueobronquites, rinofaringites, laringotraqueítes, pneumoconioses e bronquiectasias, bem como nas patologias pulmonares acompanhadas de broncoespasmo, tais como bronquite aguda, bronquite obstrutiva ou asmátiforme, asma brônquica e enfisema pulmonar.

CONTRA-INDICAÇÕES

Este medicamento é contra-indicado em casos de reconhecida hipersensibilidade ao princípio ativo ou a outros derivados da xantina e em casos de hipertensão.

PRECAUÇÕES

O produto deve ser usado com cautela em pacientes que apresentem cardiopatias, hipertensão, hipoxemia severa e úlcera péptica.

ADVERTÊNCIAS

Gravidez: evitar o uso de acebrofilina xarope durante o primeiro trimestre da gravidez.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

A acebrofilina interage com outros derivados da xantina e com betabloqueadores.

REAÇÕES ADVERSAS

Relatos de desconforto gastrointestinal (náuseas) e, ocasionalmente, tonturas. A interrupção do medicamento conduz ao rápido desaparecimento destes sintomas.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Adultos - xarope (50 mg/5 ml)

- 10 ml do xarope duas vezes ao dia.

Crianças - xarope pediátrico (25 mg/5 ml)

- 1 a 3 anos: 2 mg/kg/dia do xarope pediátrico dividido em 2 tomadas.
- 3 a 6 anos: 5,0 ml do xarope pediátrico duas vezes ao dia.
- 6 a 12 anos: 10 ml do xarope pediátrico duas vezes ao dia.

SUPERDOSE

Em caso de superdose, não ocorrendo convulsões, recomenda-se induzir o vômito ou utilizar um agente laxante ou carvão ativo. Em caso de convulsão, deve-se assegurar a manutenção da respiração e administrar oxigênio e diazepam por via I.V. (intravenosa), monitorar a pressão arterial e hidratar o paciente.

PACIENTES IDOSOS

Não existem restrições ou precauções especiais com relação ao uso do produto em pacientes idosos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

Farm. Resp.: Dra. Clarice Mitie Sano Yui

CRF-SP nº 5.115

MS - 1.0181.0476

Medley.

Medley S.A. Indústria Farmacêutica
Rua Macedo Costa, 55 - Campinas - SP
CNPJ 50.929.710/0001-79
Indústria Brasileira

S.I.M.

Serviço de
Informações Medley
0800 130666
www.medley.com.br

BU0180