

dimeticona

Medley

Rápido Alívio para:

- Estômago pesado
- Estufamento
- Inchaço
- Desconforto

Causados pelos gases

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

Comprimidos de 40 mg - embalagens contendo 20 e 200 comprimidos.

USO ADULTO

USO ORAL

COMPOSIÇÃO

Cada **comprimido** contém:

dimeticona 40 mg
excipientes q.s.p. 1 comprimido
(croscarmelose sódica, dióxido de silício coloidal; lactose monoidratada; povidona).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- **Ação esperada do medicamento:** este medicamento atua no estômago e no intestino diminuindo a tensão superficial dos líquidos digestivos, levando ao rompimento das bolhas gasosas que retêm os gases.
 - **Cuidados de armazenamento:** conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da umidade.
 - **Prazo de validade:** 24 meses a partir da data de fabricação, que pode ser verificado na embalagem externa do produto. Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Pode ser perigoso à sua saúde.
 - **Gravidez e lactação:** informe seu médico a ocorrência de gravidez durante o tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando.
 - **Cuidados de administração:** siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
 - **Interrupção do tratamento:** não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
 - **Reações adversas:** informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.
- "TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS."

- **Ingestão concomitante com outras substâncias, Contra-indicações e Precauções:** informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

"NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE."

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Descrição

A dimeticona é um silicone antiespumante, que apresenta ação antiflatulenta, aliviando o mal-estar gástrico causado pelo excesso de gases.

Um dos problemas mais comuns enfrentados pelos médicos na prática diária é o das queixas sobre excessos de gases intestinais e a distensão abdominal por eles causada, devido à aerofagia.

Ação

A dimeticona atua no estômago e no intestino, diminuindo a tensão superficial dos líquidos digestivos, levando ao rompimento das bolhas que retêm os gases. Uma vez livres, os gases são facilmente eliminados por eructações ou flatos.

INDICAÇÕES

Este medicamento é indicado no caso de excesso de gases no aparelho gastrointestinal constituindo incômodo, motivo de dores ou cólicas intestinais, tais como:

- Meteorismo;
- Eructação;
- Borborígio;
- Aerofagia;
- Pós-operatório e convalescença;
- Distúrbios fermentativos intestinais e
- É indicado ainda no preparo intestinal dos pacientes para radiografia do abdômen.

CONTRA-INDICAÇÕES

O produto é contra-indicado a pacientes com sensibilidade a dimeticona ou a qualquer outro componente da fórmula.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Ver o item **POSOLOGIA** e **REAÇÕES ADVERSAS**.



INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são descritas interações medicamentosas sobre este medicamento.

REAÇÕES ADVERSAS

Este medicamento é fisiologicamente inerte e desprovido de toxicidade. Após administração oral, é eliminado de forma inalterada pelas fezes.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Uso oral.

Tomar 1 comprimido 3 vezes ao dia, às refeições. Essa dose poderá ser aumentada à critério médico.

SUPERDOSE

Em caso de superdose acidental, consultar o médico imediatamente.

PACIENTES IDOSOS

Não há informações disponíveis sobre a relação entre a idade e os efeitos de dimeticona em pacientes idosos.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Data de fabricação, prazo de validade e n° do lote: Vide cartucho.
Farm. Resp.: Dra. Clarice Mitie Sano Yui - CRF-SP n° 5.115
MS - 1.0181.0493

Medley.

Medley S.A. Indústria Farmacêutica
Rua Macedo Costa, 55 - Campinas - SP
CNPJ 50.929.710/0001-79 - Indústria Brasileira



Serviço de
Informações Medley
0800 7298000
www.medley.com.br

BU0122/A