

Rifocort*

acetato de prednisolona
rifamicina SV sódica
Pomada dermatológica

Medley.

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Pomada: bisnagas com 10 g.
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada g contém:
rifamicina SV sódica 1,5 mg
acetato de prednisolona 5,0 mg
(excipientes: metabissulfito de sódio, propilenoglicol, ascorbato de sódio, macrogol).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 - 30°C). Proteger da luz.

Prazo de validade: 3 anos.

Não use medicamento com prazo de validade vencido.

Após aplicação, não se deve cobrir a região com bandagens oclusivas, pois elas podem induzir reações adversas.

Siga corretamente as instruções de seu médico quanto ao emprego do produto; não interrompendo ou modificando o tratamento sem antes consultá-lo. Informe-o também se estiver grávida ou amamentando.

Qualquer reação desagradável deve ser comunicada ao médico.

Podem ocorrer raramente: reações alérgicas da pele, erupções semelhantes à acne, ardor, pele seca, crescimento de pelos, diminuição da pigmentação, irritação, coceira. Se ocorrer irritação, interrompa o tratamento e consulte seu médico.

RIFOCORT* não se destina ao uso ocular e não deve ser usado para tratar micose, herpes, varicela, vacínia ou lesões de origem tuberculosa. Informe a seu médico se você tem ou já teve alergia aos componentes da fórmula.

"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS."

"NÃO TOMA REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE."

INDICAÇÕES

Complicações infecciosas das dermatites atópicas e de contato causadas por germes sensíveis à rifamicina.

PROPRIEDADES

RIFOCORT* é uma associação de um corticosteróide, a prednisolona, com um antibiótico, a rifamicina SV.

A intensa atividade da prednisolona, um dos mais enérgicos agentes antiflogísticos e antirreacionais entre os glicocorticosteróides, destaca-se, simultaneamente, à atividade da rifamicina como antibiótico bactericida.

Na ação tópica, quer os germes sejam Gram-positivos (resistentes ou não à penicilina), quer Gram-negativos, como as infecções de etiologia mista, o antibiótico faz sentir indiferentemente a sua poderosa atividade sobre os germes infectantes.

A utilização tópica da rifamicina SV tem especial interesse, pois, contrariamente à penicilina, não causa reações de sensibilização e por ser dotada de particular atividade nos casos de estafilococcia, onde a contagiosidade e frequência são mais acentuadas do que com outros tipos de bactérias.

CONTRA-INDICAÇÕES

Contra-indicado em lesões da pele de origem tuberculosa, fúngica, virótica (herpes simples, vacínia e varicela) e em pacientes com antecedentes de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. Não se destina ao uso oftalmológico.

USO DURANTE A GRAVIDEZ E LACTAÇÃO

Não se estabeleceu a inocuidade do RIFOCORT* durante a gravidez ou a lactação. Portanto, não se deve usá-lo em mulheres grávidas e lactantes a menos que, a juízo do médico, os benefícios superem os riscos potenciais.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Se ocorrer irritação da pele, deve-se suspender a aplicação.

O uso prolongado de antibióticos e corticóides pode produzir superinfecção. Em infecções causadas por estreptococo beta-hemolítico deve-se comprovar o desaparecimento completo dos germes para evitar complicações.

REAÇÕES ADVERSAS

Em ocasiões muito raras, o uso tópico de antibióticos e corticosteróides pode causar reações alérgicas locais, erupções acneiformes, ardor local, secura da pele, foliculite, hipertricose, hipopigmentação, irritação e prurido. A utilização de bandagens oclusivas pode induzir às seguintes reações colaterais: maceração da pele, infecções secundárias, atrofia dérmica e estrias atróficas.

As reações citadas regridem espontaneamente com a suspensão do tratamento.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

3 ou 4 aplicações ao dia nas partes infectadas.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Data de fabricação, prazo de validade e nº do lote: vide cartucho.

Farm. Resp.: Dra. Miriam O. Fujisawa
CRF-SP nº 10.640
MS - 1.0181.0209

Medley.

Medley S.A. Indústria Farmacêutica
Rua Macedo Costa, 55 - Campinas - SP
CNPJ 50.929.710/0001-79
Indústria Brasileira

*Marca registrada por Aventis Pharma Ltda.



Serviço de
Informações Medley

0800 130666
www.medley.com.br