

# Ureadin® 20

ureia 20%

## creme



### FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Ureadin® 20 Creme: cartucho com bisnaga contendo 50 g.  
USO ADULTO  
USO TÓPICO


### COMPOSIÇÕES

Cada g de Ureadin® 20 Creme contém:

ureia ..... 0,2 g

excipientes q.s.p. .... 1,0 g

(miristato de isopropila, petrolato líquido, sorbitol, monoestearato de glicerila, estearato de macrogol, octanoato de cetearila, dimeticona, álcool cetílico, ácido esteárico, óleo de abacate (*Persea gratissima*), carbômer 941, crosopolímero de acrilatos e acrilato de alquila, alantoina, metilparabeno, propilparabeno, essência, hidróxido de sódio, bronopol, ácido láctico e água deionizada).



### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

**Ação esperada do medicamento** - Ureadin® 20 é um produto de uso tópico, que atua como hidratante, emoliente e queratolítico no tratamento da pele seca e áspera, hiperqueratoses, iclios, eczemas e calosidades em áreas rugosas como das mãos, cotovelos, joelhos e pés.

**Cuidados de armazenamento** - Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C).

**Prazo de validade** - 36 meses, a partir da data de fabricação impressa na embalagem externa do produto. Não utilize o medicamento se o prazo de validade estiver vencido.

**Gravidez e lactação** - Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe seu médico se estiver amamentando.

**Cuidados de administração** - Exclusivamente para uso externo.

Não deixe entrar em contato com os olhos, nem utilize o produto nas áreas próximas aos mesmos. Evitar contato com as mucosas. Se, acidentalmente, o medicamento entrar em contato com os olhos, lave-os com bastante água. Não há relatos de interferências de outros medicamentos com a ureia, desde que ela seja utilizada de maneira tópica e adequada. Não aplicar sobre áreas de pele com fissuras ou outras lesões, pois pode haver ardência local. Caso isso ocorra, descontinuar o tratamento.

**Reações adversas** - Interrompa o uso do produto e informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis tais como vermelhidão ou qualquer irritação local não existente antes do seu uso.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

**Contraindicações e Precauções** - Ureadin® 20 não deve ser administrado a pacientes com alergia conhecida aos componentes da fórmula.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ureadin® 20 contém ureia, um dos componentes do Fator Natural de Hidratação (NMF) do manto hidrolipídico da pele. No NMF, a concentração de ureia varia de 4% a 7%. Quando aplicada topicamente, a ureia apresenta ação hidratante, queratolítica e descamativa, devido à sua capacidade de solubilizar e desnaturar as proteínas da pele (ação proteolítica) e aumentar a hidratação por sua capacidade de se unir à água e acelerar a penetração cutânea.

000207169

0201



## INDICAÇÕES

Ureadin® 20 é indicado como hidratante, emoliente e queratolítico no tratamento da pele seca e áspera, hiperqueratoses, ictioses, eczemas e calosidades em áreas rugosas de mãos, cotovelos, joelhos e pés.

## CONTRAINDICAÇÕES

O produto é contraindicado a pessoas com antecedentes de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

## REAÇÕES ADVERSAS

Podem ocorrer reações desagradáveis, tais como vermelhidão ou irritação local. Caso isso ocorra, interrompa o uso do produto.

## PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Exclusivamente para uso externo. Não deixe entrar em contato com os olhos, nem utilize o produto nas áreas próximas aos mesmos. Se, acidentalmente, o medicamento entrar em contato com os olhos, lavar com bastante água. Evitar contato com mucosas. Não aplicar sobre áreas de pele com fissuras ou outras lesões, pois pode haver ardência local. Caso isso ocorra, descontinuar o tratamento.

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe seu médico se estiver amamentando.

## INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não há relatos de interações medicamentosas com a ureia, desde que ela seja utilizada de maneira tópica e adequada.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

Aplicar uniformemente sobre as áreas ressecadas da pele, 2 a 3 vezes ao dia.

## SUPERDOSE

Não existe um antídoto específico disponível para a superdose tópica crônica. O tratamento é sintomático, de suporte e consiste na descontinuação da terapia.

## PACIENTES IDOSOS

Embora estudos apropriados com ureia tópica em idosos não terem sido realizados, problemas específicos à Geriatria não limitam a utilidade dos mesmos nos pacientes idosos.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

Data de fabricação, prazo de validade e nº do lote: vide cartucho.

Farm. Resp.: Dra. Miriam Onoda Fujisawa - CRF-SP nº 10.640  
MS - 1.0181.0419



**Medley Indústria Farmacêutica Ltda.**  
Rua Macedo Costa, 55 - Campinas - SP  
CNPJ 50.929.710/0001-79 - Indústria Brasileira

Fabricado sob licença de **ISDIN SA** - Barcelona - Espanha



000207169

