

# acetato de clostebol + sulfato de neomicina

*Medley*

## FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Creme dermatológico, embalagem contendo bisnaga com 30 g.

USO ADULTO

USO TÓPICO

## COMPOSIÇÃO

Cada g do **creme dermatológico** contém:

acetato de clostebol ..... 5 mg  
neomicina (equivalente a 8,333 mg de sulfato de neomicina) ..... 5 mg  
veículo q.s.p. .... 1 g  
(cera emulsificante não iônica, dimeticona, essência nuance, lanolina anidra, metilparabeno, polissorbato 80, propilparabeno, triglicérido de ácidos cáprico e caprílico, água deionizada).

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

• **Ação esperada do medicamento:** acetato de clostebol + sulfato de neomicina é um creme cicatrizante que resulta de uma associação para uso local.

O produto é indicado no tratamento de erosões, lesões ulcerativas da pele (úlceras de varizes, escaras de decúbito, úlceras traumáticas), intertrigo, fissuras dos seios, fissuras anais, queimaduras, feridas infectadas, lesões com cicatrização demorada e radiodermatites.

A ação do medicamento inicia-se logo após a aplicação.

• **Cuidados de armazenamento:** conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

• **Prazo de validade:** 24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem externa do produto. Não utilize o medicamento se o prazo de validade estiver vencido. Pode ser prejudicial à sua saúde.

• **Gravidez e lactação:** informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando. O produto é contra-indicado no tratamento das infecções mamárias em mulheres que estejam amamentando.

• **Cuidados de administração:** siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as

doses e a duração do tratamento.

• **Interrupção do tratamento:** não interromper o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

• **Reações adversas:** informe ao médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como coceiras (pruridos) e erupções na pele (rash cutâneo). "TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS."

• **Contra-indicações e Precauções:** o medicamento deve ser usado com cautela em pacientes com insuficiência renal.

O produto é contra-indicado a pacientes que apresentam hipersensibilidade a acetato de clostebol (ou outros derivados da testosterona), sulfato de neomicina ou a qualquer componente da fórmula. Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

"NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE."

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS

O acetato de clostebol + sulfato de neomicina é um creme cicatrizante que resulta de uma associação para uso local: um anabolizante amplamente utilizado na prática clínica (clostebol) e um antibiótico de ação local (neomicina).

O produto exerce um efeito trófico-cicatrizante e proporciona uma diminuição acentuada do período de cura das lesões cutâneas e cutâneo-mucosas. O clostebol utilizado topicamente estimula, pela atividade anabolizante protéica, o processo de cura das lesões ulcerativas e distróficas, cutâneas e mucosas.

Na associação de acetato de clostebol com sulfato de neomicina, o efeito trófico-cicatrizante do esteroide se une à atividade do antibiótico, neomicina, necessária para o controle do componente infeccioso que, frequentemente, representa um fator que agrava e atrasa a cura das lesões.

O excipiente do creme é dermófilo, provido de poder de penetração e difusão através da epiderme. Também possui uma ação emoliente e um pH ótimo para a pele, não sendo untuoso e não manchando.

## INDICAÇÕES

O acetato de clostebol + sulfato de neomicina creme dermatológico é indicado nos casos de erosões, lesões ulcerativas cutâneas (úlceras de varizes, escaras de decúbito, úlceras traumáticas), intertrigo, fissuras dos seios, fissuras anais, queimaduras, feridas infectadas, cicatrização demorada, radiodermatites.

## CONTRA-INDICAÇÕES

O medicamento é contra-indicado a pacientes que apresentam hipersensibilidade a acetato de clostebol (ou outros derivados da testosterona), sulfato de neomicina ou a qualquer componente da fórmula. O produto é também contra-indicado em casos de infecções mamárias em período de aleitamento.

## PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

O medicamento deve ser utilizado com cautela em pacientes com insuficiência renal.

## INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não há relatos de interações medicamentosas, desde que o produto seja utilizado de maneira adequada.

## REAÇÕES ADVERSAS

Ainda não são conhecidas a intensidade e frequência das reações adversas. Existem relatos de ocorrência rara de prurido e *rash* cutâneo.

## POSOLOGIA

Aplicar uma fina camada de creme, 1-2 vezes ao dia, sobre a parte lesada, após a limpeza da mesma.

## SUPERDOSE

Não há relatos de superdosagem com o uso do produto.

## PACIENTES IDOSOS

Não há relatos de problemas específicos relacionados à idade.

## VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Data de fabricação, prazo de validade e nº do lote:  
Vide cartucho.

Farm. Resp.: Dra. Miriam Onoda Fujisawa  
CRF-SP nº 10.640  
MS: 1.0181.0534

The logo for Medley, featuring the word "Medley" in a stylized, teal-colored font with a horizontal line underneath.

**Medley S.A.** Indústria Farmacêutica  
Rua Macedo Costa, 55 - Campinas - SP  
CNPJ 50.929.710/0001-79 - Indústria Brasileira



Serviço de  
Informações Medley  
0800 7298000  
www.medley.com.br