

maleato de dexclorfeniramina *Medley.*

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

O maleato de dexclorfeniramina creme é indicado para uso na pele.

O produto apresenta-se em bisnagas com 30 g.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS USO TÓPICO

Cada grama do **creme** a 1,0% contém 10 mg de maleato de dexclorfeniramina.

Componentes inativos: cera emulsificante não-iônica, metilparabeno, propilparabeno, lanolina anidra, petrolato branco, triglicerídeo de ácidos cáprico e caprílico, propilenoglicol, polissorbato 60, alantoína, essência de lavanda, água deionizada.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O maleato de dexclorfeniramina pertence a uma classe de medicamentos conhecidos como antialérgicos (anti-histamínicos). Os antialérgicos (anti-histamínicos) ajudam a reduzir os sintomas de alergia causados por substâncias estranhas que entram em contato com nosso corpo. O maleato de dexclorfeniramina creme contém alantoína que estimula a regeneração da pele.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

O maleato de dexclorfeniramina creme é indicado para o alívio do prurido, alergias, coceiras, urticária e picadas de insetos.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

CONTRAINDICAÇÕES

Não utilize maleato de dexclorfeniramina creme se você já teve algum tipo de reação incomum a qualquer um dos componentes da fórmula do produto.

ADVERTÊNCIAS

O maleato de dexclorfeniramina não é indicado para o uso nos olhos (oftálmico).

Deve-se evitar a exposição à luz do sol das áreas tratadas com maleato de dexclorfeniramina creme, pois podem ocorrer reações indesejáveis na pele.

O tratamento deverá ser suspenso se ocorrer

sensação de queimação, erupções, desenvolvimento de irritações ou se não houver melhora do quadro.

Evite o uso prolongado ou o uso em áreas extensas da pele, principalmente em crianças.

• Uso durante a gravidez e amamentação

A segurança para o uso na pele de antialérgicos durante a gravidez e a amamentação não está estabelecida.

• Uso em crianças e idosos

Em casos raros, a absorção pela pele de maleato de dexclorfeniramina creme pode provocar excitabilidade, principalmente em crianças.

A segurança e eficácia deste produto não foram estabelecidas em crianças abaixo de 2 anos de idade.

PRECAUÇÕES

Não se deve aplicar maleato de dexclorfeniramina creme: em áreas da pele que apresentam bolhas, em áreas da pele que não estejam íntegras ou que apresentem secreção, ao redor dos olhos, genitália ou em outras mucosas.

Deve-se evitar cobrir a área que está sendo tratada.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• Interações Medicamentosas com Testes Laboratoriais

O tratamento com antialérgicos deverá ser suspenso aproximadamente 48 horas antes de se efetuar qualquer tipo de teste laboratorial na pele, pois o uso do produto poderá interferir no resultado do exame.

"Este medicamento é contraindicado na faixa etária abaixo de 2 anos de idade, incluindo recém-nascidos e prematuros."

"Informe seu médico ou cirurgião-dentista sobre o aparecimento de reações indesejáveis."

"Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento."

"Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista."

0084



0084

0084



COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

ASPECTO FÍSICO

Verifique se o medicamento que você adquiriu possui as seguintes características:

- maleato de dexclorfeniramina creme apresenta cor branca, com odor de lavanda.

DOSAGEM

Aplicar maleato de dexclorfeniramina creme sobre a área da pele afetada duas vezes ao dia.

COMO USAR

O maleato de dexclorfeniramina creme só deve ser aplicado externamente. Não deve ser aplicado nos olhos, boca e nariz e não deve ser utilizado em áreas extensas da pele, principalmente em crianças.

“Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou do seu cirurgião-dentista.”

“Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.”

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Junto com os efeitos necessários para seu tratamento, os medicamentos podem causar efeitos não desejados. Apesar de nem todos estes efeitos colaterais ocorrerem, você deve procurar atendimento médico caso algum deles ocorra.

Antialérgicos para uso na pele podem causar sensibilização e irritação local, especialmente com o uso prolongado.

Efeitos colaterais sistêmicos têm sido reportados após aplicação na pele de antialérgicos em áreas extensas.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Este medicamento deve ser utilizado somente na dose recomendada. Se você utilizar grande quantidade deste medicamento, procure imediatamente socorro médico, levando também a bula do produto.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

O maleato de dexclorfeniramina creme deve ser guardado em locais com temperatura entre 15 e 30 °C. O prazo de

validade do produto é de 24 meses e encontra-se gravado na embalagem externa. Em caso de vencimento, não utilize o produto.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Data de fabricação, prazo de validade e nº do lote: vide cartucho.

Farm. Resp.: Dra. Miriam Onoda Fujisawa

CRF-SP nº 10.640

MS - 1.0181.0571

Medley Indústria Farmacêutica Ltda.

Rua Macedo Costa, 55 - Campinas - SP

CNPJ 50.929.710/0001-79 - Indústria Brasileira

Serviço de
Informações Medley
0800 7298000
www.medley.com.br



0084

000206406