

propionato de clobetasol

Medley.

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Solução capilar: frasco com 50 g.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

USO TÓPICO

COMPOSIÇÃO

Cada g da **solução** contém:

propionato de clobetasol 0,5 mg

veículo q.s.p. 1 g

(água deionizada, álcool isopropílico, carbômer 934P, hidróxido de sódio).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O propionato de clobetasol reduz os efeitos da inflamação em algumas doenças da pele tais como, eczemas difíceis de tratar e psoríase. O propionato de clobetasol é de um grupo de medicamentos chamados esteróides tópicos. "Tópico" significa que são usados sobre a pele. Os esteróides tópicos reduzem a vermelhidão e a coceira provocada por determinados problemas da pele.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

Este medicamento é indicado no tratamento de infecções do couro cabeludo, tais como eczemas recalcitrantes e psoríase.

RISCOS DO MEDICAMENTO

CONTRA-INDICAÇÕES

Se você responder "SIM" a qualquer uma das perguntas abaixo, fale com seu médico a respeito, antes de usar propionato de clobetasol:

- Você já teve uma reação alérgica a algum dos componentes presentes na formulação (veja em COMPOSIÇÃO)?

- Você apresenta infecções no couro cabeludo?

- A criança tem menos de 1 ano de idade e apresenta dermatite?

ADVERTÊNCIAS

Antes de usar o medicamento leia atentamente as observações a seguir:

- tenha cuidado para não cair nos olhos;

- não use próximo ao fogo;

- deve-se evitar o uso por longos períodos, principalmente em bebês ou crianças;

- se a lesão na pele tornar-se infectada, terapia antimicrobiana sistêmica deve ser iniciada;

- deve-se ter um cuidado maior quando o produto for usado para psoríase;

- é aconselhável não utilizar por tempo prolongado ou em grandes quantidades durante a gestação; e a segurança e eficácia do uso durante a amamentação ainda não estão estabelecidas.

PRECAUÇÕES

O local de aplicação deve ser limpo antes do uso do produto, para evitar infecções.

Deve-se lavar as mãos após a aplicação, exceto se as mãos estiverem sendo tratadas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são conhecidas interações relevantes com medicamentos, alimentos e exames laboratoriais.

• Efeitos na habilidade de dirigir e operar máquinas:

Não é esperado que propionato de clobetasol influencie na capacidade de dirigir e operar máquinas.

"Este medicamento não deve ser usado por mulheres grávidas sem orientação médica."

"Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez."

"Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis."

"Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento."

"Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde."

"Este medicamento é contra-indicado para crianças abaixo de 1 ano de idade para o tratamento de dermatites."

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

ASPECTO FÍSICO

O propionato de clobetasol capilar é apresentado sob a forma de uma solução opalescente, límpida, levemente viscosa.

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Vide ASPECTO FÍSICO

POSOLOGIA

Aplique pequena quantidade na região afetada à noite e pela manhã, até que melhore. Se for necessário tratamento contínuo com esteróides, deve-se usar uma formulação menos potente.

"Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento."

"Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico."

"Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento."

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Reações alérgicas locais como vermelhidão, coceira, ardência e dermatite alérgica por contato, podem ocorrer no local de aplicação e podem se parecer com os sintomas das doenças que estão em tratamento. Se estes sintomas persistirem, PARE de usar a solução capilar imediatamente e consulte seu médico, já que isso pode ser uma reação alérgica ou você pode ter uma infecção na pele.

Se grandes quantidades de propionato de clobetasol forem usadas por longos períodos ou em áreas extensas, podem ocorrer sinais e sintomas semelhantes aos ocorridos com o aumento nos níveis de uma substância chamada cortisol, mais provavelmente em crianças ou quando curativos oclusivos (bandagens) forem utilizados. A fralda pode agir como um curativo oclusivo.

Atrofia local (afinamento da pele) pode ocorrer após tratamentos prolongados.

Em situações muito raras, acredita-se que o tratamento de psoríase com corticosteróides (ou sua retirada) possa provocar a forma pustular da doença.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTES MEDICAMENTOS DE UMA SÓ VEZ?

Superdose aguda é muito improvável de ocorrer. Entretanto, no caso de superdose crônica ou uso impróprio os esteróides tópicos devem ser reduzidos ou descontinuados gradualmente sob supervisão médica devido ao risco de insuficiência adrenal.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Este produto deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 - 30°C) e protegido da luz.

O prazo de validade do produto é de 18 meses. Não utilize o medicamento se o seu prazo de validade estiver vencido, o que pode ser verificado na embalagem externa

do produto.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Nº do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

Farm. Resp.: Dra Clarice Mitie Sano Yui

CRF-SP nº 5.115

MS - 1.0181.0360

The logo for Medley S.A. features the word "Medley" in a stylized, cursive font with a horizontal line underneath it.

Medley S.A. Indústria Farmacêutica
Rua Macedo Costa, 55 - Campinas - SP
CNPJ 50.929.710/0001-79
Indústria Brasileira



Serviço de
Informações Medley
0800 7298000
www.medley.com.br